

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Saúde

ESQUEMA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA

VACINA	PROTEÇÃO CONTRA	COMPOSIÇÃO	Nº DOSES		INÍCIO DA VACINAÇÃO		INTERVALO ENTRE AS DOSES		DOSAGEM *	VIA DE ADMINISTRAÇÃO	LOCAL DE APLICAÇÃO	AGULHA HIPODÉRMICA RECOMENDADA	TEMPO DE VALIDADE APÓS ABERTO O FRASCO ***	ALGUNS EVENTOS ADVERSOS
			VACINAÇÃO BÁSICA	REVACINAÇÃO OU REFORÇO	MÍNIMA	MÁXIMA	RECOMENDADO	MÍNIMO						
BCG	Tuberculose	Bactéria viva atenuada	Dose única	Depende da indicação (1)	Ao nascer	4 anos, 11 meses e 29 dias (1)	-	-	0,1 ml	Intradérmica (ID)	Inserção inferior do músculo deltoide direito	13x3,8	6 horas (multidose)	Reações locais e/ou regionais, granuloma, úlcera >1 cm, abscesso e linfadenopatias regionais
Hepatite B (HB recombinante)	Hepatite B	Partícula da cápsula do vírus antígeno de superfície	1 dose (2)	-	Ao nascer	30 dias	-	-	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa esquerda	20x5,5 25x6	10 ou 15 dias (multidose)	Reações locais, febre, cefaleia, fadiga, púrpura, desconforto e gastroenterite leve
Poliomielite 1, 2 e 3 (VIP - inativada)	Poliomielite	Vírus inativado tipos I, II e III	3 doses	-	2 meses	4 anos, 11 meses e 29 dias	60 dias	30 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa esquerda	20x5,5 25x6	7 ou 28 dias (multidose)	Reações locais, febre, reações de hipersensibilidade
Poliomielite 1 e 3 (VOP - atenuada)	Poliomielite	Vírus vivo atenuado tipos I e III	-	1º ref. 15 meses 2º ref. 4 anos	15 meses	4 anos, 11 meses e 29 dias	1º ref. 15 meses 2º ref. 3 anos após 1º ref.	1º ref. 6 meses após 3ª dose 2º ref. 6 meses após 1º ref.	2 gotas	Oral (VO)	Cavidade oral	-	5 dias ou 4 semanas (multidose)	Poliomielite associada ao vírus vacinal – VAPP
Rotavírus humano G1P1 (VORH) (3)	Diarreia por Rotavírus	Vírus vivo atenuado	2 doses	-	1ª dose: 1 mês e 15 dias. 2ª dose: 3 meses e 15 dias	1ª dose: 3 meses e 15 dias. 2ª dose: 7 meses e 29 dias	60 dias	30 dias **	1,5 ml	Oral (VO)	Cavidade oral	-	Uso imediato (monodose)	Invaginação intestinal, irritabilidade, vômito e diarreia moderados
DTP+Hib+HB (Penta)	Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite por Haemophilus Influenzae b e Hepatite B	Bactéria morta e produto de toxinas. Polissacarídeo do Hib, conjugado a uma proteína/antígeno de superfície de HB	3 doses	1º ref. 15 meses 2º ref. 4 anos com a vacina DTP	2 meses	4 anos, 11 meses e 29 dias	60 dias	30 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa direita	20x5,5 25x6	Uso imediato após preparo (monodose)	Reações locais, febre, sonolência, vômito, irritabilidade, choro persistente, EHH, convulsão e reações imunoalérgicas
Pneumocócica 10 valente (Pnc10)	Pneumonias, Meningites, Otites e Sinusites pelos sorotipos que compõem a vacina	Polissacarídeo capsular de 10 sorotipos pneumococos	2 doses	12 meses	2 meses	4 anos, 11 meses e 29 dias	60 dias	30 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa esquerda	20x5,5 25x6	Uso imediato após preparo (monodose)	Reações locais, febre, irritabilidade, sonolência, perda de apetite, convulsões e EHH
Meningocócica C conjugada (MncC)	Meningite tipo C	Oligossacarídeo conjugado com a proteína CRM (197)	2 doses	12 meses	3 meses	4 anos, 11 meses e 29 dias	60 dias	30 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa direita	20x5,5 25x6	Uso imediato após reconstituição (monodose)	Reações locais, febre, irritabilidade, sonolência, cefaleia, diarreia e vômito
Febre Amarela (FA)	Febre Amarela (4)	Vírus vivo atenuado	1 dose	-	9 meses ***	59 anos, 11 meses e 29 dias	-	-	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Região deltoideana	13x4,5	6 horas (multidose)	Reações locais, febre, mialgia, cefaleia, doença viscerotrópica aguda
Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR) (5)	Sarampo, Caxumba e Rubéola	Vírus vivo atenuado	1 dose	15 meses com Tetraviral	12 meses (5)	-	-	-	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Região deltoideana	13x4,5	6 ou 8 horas (multidose)	Febre, cefaleia, exantema, artralgia, artrite, púrpura, trombocitop. e anafilaxia
Sarampo, Caxumba, Rubéola, Varicela (SCRV)	Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela	Vírus vivo atenuado	1 dose	-	15 meses	4 anos, 11 meses e 29 dias	-	-	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Região deltoideana	13x4,5	Uso imediato após reconstituição (monodose)	EAPV da SCR + reações locais, vesículas no local da aplicação, maculopapulas e anafilaxia
Hepatite A (HA)	Hepatite A	Culturas celulares em fibroblastos e inativadas pela formalina	1 dose	-	15 meses	4 anos, 11 meses e 29 dias	-	-	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa esquerda	20x5,5 25x6	Uso imediato após preparo (monodose)	Reações locais, febre, diarreia, vômito, fadiga e anafilaxia
Difteria, Tétano, Pertussis (DTP) (6)	Difteria, Tétano e Coqueluche	Bactéria morta e produto de bactéria (toxina)	3 doses (considerar doses anteriores)	1º ref. 15 meses 2º ref. 4 anos (6)	15 meses	6 anos, 11 meses e 29 dias	1º ref. 9 meses após 3ª dose 2º ref. 3 anos após 1º ref.	1º ref. 6 meses após 3ª dose 2º ref. 6 meses após 1º ref.	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa direita	20x5,5 25x6	15 dias (multidose)	Reações locais, febre, sonolência, vômito, choro persistente, irritabilidade, EHH, convulsão e reações imunoalérgicas
Difteria, Tétano (dT)	Difteria e Tétano	Produto de bactéria (toxina)	3 doses (considerar doses anteriores)	A cada 10 anos. Ferimentos graves a cada 5 anos	7 anos	-	60 dias	30 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Deltoide, vasto lateral da coxa direita	25x6	15 dias (multidose)	Reações locais, nódulos, febre, cefaleia, sonolência, vômito e linfonodomegalia
Varicela (VZ)	Varicela	Vírus vivo atenuado	1 dose (7)	-	4 anos	6 anos, 11 meses e 29 dias	-	-	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Região deltoideana	13x4,5	Uso imediato após preparo (monodose)	Reações locais, febre e exantema

ESQUEMA DE VACINAÇÃO DO ADOLESCENTE ****

VACINA	PROTEÇÃO CONTRA	COMPOSIÇÃO	Nº DOSES		INÍCIO DA VACINAÇÃO		INTERVALO ENTRE AS DOSES		DOSAGEM *	VIA DE ADMINISTRAÇÃO	LOCAL DE APLICAÇÃO	AGULHA HIPODÉRMICA RECOMENDADA	TEMPO DE VALIDADE APÓS ABERTO O FRASCO ***	ALGUNS EVENTOS ADVERSOS
			VACINAÇÃO BÁSICA	REVACINAÇÃO OU REFORÇO	MÍNIMA	MÁXIMA	RECOMENDADO	MÍNIMO						
Hepatite B (HB recombinante) (2)	Hepatite B	Partícula da cápsula do vírus antígeno de superfície	3 doses (considerar doses anteriores)	-	-	-	2ª dose: 1 mês após 1ª. 3ª dose: 5 meses após 2ª dose	2ª dose: 1 mês após 1ª, 3ª dose: 2 meses após 2ª dose	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Músculo deltoide	25x6 25x7	15 dias	Reações locais, febre, cefaleia, fadiga, púrpura, desconforto e gastroenterite leve
Difteria, Tétano (dT)	Difteria e Tétano	Produto de bactéria (toxina)	3 doses (considerar doses anteriores)	A cada 10 anos. Ferimentos graves a cada 5 anos	-	-	60 dias	30 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Músculo deltoide	25x6 25x7	15 dias (multidose)	Reações locais, nódulos, febre, cefaleia, abscessos, sonolência, vômito e linfonomegalia
Febre Amarela (FA)	Febre Amarela (4)	Vírus vivo atenuado	1 dose	-	-	59 anos, 11 meses e 29 dias	-	-	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Região deltoideana	13x4,5	6 horas (multidose)	Reações locais, febre, mialgia, cefaleia e doença viscerotrópica aguda
Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR) (5)	Sarampo, Caxumba e Rubéola	Vírus vivo atenuado	2 doses (≤ 29 anos/ considerar doses anteriores)	-	-	-	90 dias	30 dias	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Região deltoideana	13x4,5	6 ou 8 horas (multidose)	Febre, cefaleia, exantema, artralgia, artrite, púrpura, trombocitop. e anafilaxia
Papilomavírus Humano (HPV)	Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante)	Partícula da cápsula do vírus antígeno de superfície	2 doses	-	9 anos para meninas e 11 anos para meninos	14 anos para meninas e para meninos	2ª dose: 6 meses após 1ª dose	2ª dose: 6 meses após 1ª dose	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Músculo deltoide	25x6 25x7	Uso imediato após preparo (monodose)	Reações locais, febre, cefaleia, gastroenterite, síncope e anafilaxia
Difteria, Tétano, Pertussis acelular (dTpa) (8)	Difteria, Tétano e Coqueluche	Bactéria morta e produto de bactéria (toxina)	1 dose	1 dose a cada gestação	Gestantes a partir de 10 anos de idade, a partir da 20ª semana	-	60 dias após dT	30 dias após dT	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Músculo deltoide	25x6 25x7	Uso imediato após preparo (monodose)	Reações locais, febre, EHH, convulsão e anafilaxia (raramente)
Meningocócica C conjugada (MncC)	Meningite tipo C	Oligossacarídeo conjugado com a proteína CRM (197)	1 dose	-	11 anos	14 anos, 11 meses e 29 dias	-	-	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Músculo deltoide direito	20x5,5 25x6	Uso imediato após reconstituição (monodose)	Reações locais, febre, irritabilidade, sonolência, cefaleia, diarreia e vômito

ESQUEMA DE VACINAÇÃO DO ADULTO E DO IDOSO ****

VACINA	PROTEÇÃO CONTRA	COMPOSIÇÃO	Nº DOSES		INÍCIO DA VACINAÇÃO		INTERVALO ENTRE AS DOSES		DOSAGEM *	VIA DE ADMINISTRAÇÃO	LOCAL DE APLICAÇÃO	AGULHA HIPODÉRMICA RECOMENDADA	TEMPO DE VALIDADE APÓS ABERTO O FRASCO ***	ALGUNS EVENTOS ADVERSOS
			VACINAÇÃO BÁSICA	REVACINAÇÃO OU REFORÇO	MÍNIMA	MÁXIMA	RECOMENDADO	MÍNIMO						
Hepatite B (HB recombinante) (2)	Hepatite B	Partícula da cápsula do vírus antígeno de superfície	3 doses (considerar doses anteriores)	-	-	-	2ª dose: 1 mês após 1ª dose. 3ª dose: 5 meses após 2ª dose	2ª dose: 1 mês após 1ª dose. 3ª dose: 2 meses após 2ª dose	0,5 ml até 19 anos, acima 1 ml	Intramuscular (IM)	Músculo deltoide	25x6 25x7	15 dias (multidose)	Reações locais, febre, cefaleia, fadiga, púrpura, desconforto e gastroenterite leve
Difteria, Tétano (dT)	Difteria e Tétano	Produto de bactéria (toxina)	3 doses (considerar doses anteriores)	A cada 10 anos. Ferimentos graves a cada 5 anos	-	-	60 dias	30 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Músculo deltoide	25x6 25x7	15 dias (multidose)	Reações locais, nódulos, febre, cefaleia, abscessos, sonolência, vômito e linfonomegalia
Febre Amarela (FA)	Febre Amarela (4)	Vírus vivo atenuado	1 dose	-	-	59 anos, 11 meses e 29 dias	-	-	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Região deltoideana	13x4,5	6 horas (multidose)	Reações locais, febre, mialgia, cefaleia e doença viscerotrópica aguda
Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR) (5)	Sarampo, Caxumba e Rubéola	Vírus vivo atenuado	1 dose (> 29 anos/ considerar doses anteriores)	-	-	49 anos	-	-	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Região deltoideana	13x4,5	6 ou 8 horas (multidose)	Febre, cefaleia, exantema, artralgia, artrite, púrpura, trombocitop. e anafilaxia
Influenza (9)	Gripe por Influenza	Vírus fracionado inativado	1 dose	Dose anual	60 anos	-	-	-	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Músculo deltoide	25x6 25x7	7 dias (multidose)	Reações locais, cefaleia, febre, mal-estar, mialgia e SGB
Pneumocócica 23-valente (Pnc23) (10)	Meningites bacterianas, Pneumonias, Sinusite etc.	Polissacarídeo capsular de 23 sorotipos pneumococos	1 dose	Se necessário, 5 anos após 1ª dose	60 anos	-	-	-	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Músculo deltoide	25x6 25x7	Uso imediato após preparo (monodose)	Reações locais, febre, mialgias, artralgia, cefaleia e astenia

VACINAS APLICADAS EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO – CONSULTE ESQUEMA BÁSICO: Programas/Programa Estadual de Imunização em saude.pr.gov.br

OBSERVAÇÃO:

- Na ausência de cicatriz, esta vacina pode ser aplicada até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Considerar o intervalo mínimo de 6 meses entre as doses. Comunicantes de Hanseníase, administrar uma dose conforme portaria vigente MS.
- Em crianças, iniciar esquema com VHB monovalente e prosseguir esquema com DTP+Hib+HB. Esta vacina está disponível também para indivíduos a partir de 5 anos de idade, incluindo gestantes, conforme histórico vacinal.
- Se regurgitar, cuspir ou vomitar após a vacinação, não repetir a dose, considerar dose válida.
- Esta vacina é disponibilizada para crianças com 9 meses de idade, nascidas a partir de 2017, residentes em Áreas Sem Recomendação para Vacinação (ASRV). Em Áreas Com Recomendação para Vacinação (ACRV) está recomendada para a população de 9 meses a 59 anos de idade.
- Esta vacina só poderá ser administrada em: gestantes, mulheres amamentando crianças menores de 6 meses de idade, indivíduos a partir dos 60 anos de idade e imunodeprimidos, com prescrição médica.
- Indicada vacinação em bloqueios de casos suspeitos de sarampo e rubéola a partir dos 6 meses. Após a aplicação da vacina, recomenda-se não engravidar por um período de 30 dias. Na primovacinação não pode ser aplicada simultaneamente com a vacina da Febre Amarela, estabelecendo o intervalo mínimo de 30 dias.
- Utilizada para 1ª e 2ª dose de reforço das vacinas tetravalente/penta (DTP+Hib/DTP+Hib+HB).
- A 2ª dose da vacina Varicela deverá ser administrada de 4 a 6 anos de idade. A 1ª dose é ofertada aos 15 meses com a vacina Tetraviral (SCRV).

8 Esta vacina será disponibilizada para gestantes, a partir da 20ª semana até a 36ª semana de gestação. Para as que perderam a oportunidade de vacinar durante a gestação, realizar uma dose no puerpério o mais rápido possível.

9 Oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação, conforme orientação PNI/MS.

10 Administrar 1 (uma) dose durante a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza nos indivíduos de 60 anos e mais que vivem em instituições fechadas como: casas geriátricas, hospitais, asilos, casas de repouso. Quando indicada, administrar dose adicional 5 anos após a dose inicial, uma única vez.

- A aplicação de uma ou mais vacinas no mesmo dia não oferece nenhum risco à pessoa vacinada, exceto na primovacinação das vacinas SCR/SCRV e Febre Amarela, devendo, então, ser respeitado o intervalo mínimo de 30 dias.

- Se o esquema da vacinação for interrompido, não é necessário reiniciá-lo, basta completar com as doses que faltam (desde que apresente registro de vacinação).

* Verificar indicação do PNI.

** Considerar idade mínima para administrar 2ª dose.

*** Poderá variar de acordo com o laboratório produtor.

**** Considerar histórico de vacinação anterior.