

# DOENÇA DE CHAGAS: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO



Testes rápidos podem ser utilizados como triagem, em áreas sem uma rede laboratorial adequada, com difícil acesso aos serviços de saúde e em gestantes com suspeita de doença de Chagas durante o pré-natal ou em trabalho de parto.

**É INDICADO PARA TODOS OS CASOS EM FASE AGUDA E DE REATIVAÇÃO DA DOENÇA. PARA AS PESSOAS NA FASE CRÔNICA, A INDICAÇÃO DO TRATAMENTO DEPENDE DA FORMA CLÍNICA E DEVE SER AVALIADA CASO A CASO, TENDO MAIOR BENEFÍCIO NAQUELES NA FORMA INDETERMINADA, ESPECIALMENTE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS ATÉ 50 ANOS DE IDADE.**

**AS PESSOAS NA FORMA CARDÍACA E/OU DIGESTIVA DEVEM SER ACOMPANHADAS E RECEBEREM O TRATAMENTO ADEQUADO PARA AS COMPLICAÇÕES EXISTENTES.**

Medicamento	Público	Posologia
Benznidazol (primeira escolha) Comprimidos de 12,5 mg (pediátrico*) e de 100 mg (adulto)  *Na ausência de formulação pediátrica, realizar manipulação do comprimido de 100 mg para ajuste de dose, caso necessário.	Adulto	(1) 5 mg/kg/dia, 1 a 2 x/dia, por 60 dias, ou (2) 300 mg/dia, em 2 a 3 doses diárias, pelo número de dias, equivalente ao peso do indivíduo (máximo 80 dias)
	Pediátrico	5 a 10 mg/kg/dia, 2 ou 3 x/dia, por 60 dias Esquemas sugeridos conforme peso: • Entre 2,5 e 5 kg: 1 comprimido (12,5 mg), 2x ao dia • Entre 5 e 10 kg: 2 comprimidos (25 mg), 2x ao dia • Entre 10 e 15 kg: 3 comprimidos (37,5 mg), 3x ao dia
Nifurtimox (alternativa à intolerância ou que não respondam ao tratamento com benznidazol) Comprimidos de 120 mg	Adulto	10 mg/kg/dia, 3 x/dia, por 60 dias
	Pediátrico	15 mg/kg/dia, 3 x/dia, por 60 dias