



NOTA TÉCNICA n° 04/2016

Ementa: *Orientações para solicitação de sorologia para Hepatites Virais ao Lacen/PR*

A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da coordenação do Laboratório Central de Saúde Pública do Paraná (LACEN/PR) e da Superintendência de Vigilância em Saúde, Centro de Epidemiologia e Divisão Estadual de DST/Aids, Hepatites Virais (HV) e Tuberculose (TB), vem, por meio desta Nota Técnica, divulgar orientações para o envio de amostras para o Lacen/PR para realização de sorologia das Hepatites Virais.

Para Hepatite A

Encaminhar somente os casos suspeitos de infecção aguda pelo vírus da Hepatite A para a pesquisa do anticorpo IgM contra o vírus da Hepatite A (HAV).

Solicitar no GAL: Hepatite A - Lacen

Observação: O Lacen/PR não realiza anti-HAV IgG e anti-HAV total.

Para Hepatite B

- HBsAg – testar este marcador através de Testes Rápidos – TR na Unidade de Atendimento ou através de sorologia em laboratórios locais, para a triagem da infecção pelos vírus da Hepatite B (HBV);

Encaminhar somente os casos com HBsAg reagente, para confirmação no Lacen/PR.

Solicitar no GAL: Hepatite B - Lacen

Na solicitação para Pesquisa de Hepatite B, no GAL, constam 6 marcadores. No entanto, serão realizados conforme avaliação do conjunto de resultados obtidos e informações clínicas cadastradas do paciente.

- HBsAg e Anti HBc Total – serão realizados pelo Lacen/PR, prioritariamente;

- Anti-HBs – será realizado somente para acompanhamento de cura do paciente, a critério do Lacen/PR;



- Anti HBc-IgM – será realizado para definição de estado agudo a critério do Lacen/PR;

- HBeAg e Anti HBe - serão realizados somente para acompanhamento de paciente crônico (paciente com HBsAg reagente há mais de 6 meses ou outros sinais clínicos). Informar devidamente no campo "Observações" do GAL.

Importante: O Lacen/PR não realiza pesquisa de Anti-HBs para avaliação de vacina de Hepatite B.

Para Hepatite C

- Anti-HCV – testar através de Testes Rápidos – TR, na Unidade de Atendimento ou através de sorologia em laboratórios locais, para a triagem da infecção pelo vírus da Hepatite C (HCV).

Encaminhar somente os casos reagentes, para confirmação no Lacen/PR.

Solicitar no GAL: Hepatite C – Lacen

Importante: Somente depois de confirmado o anti-HCV pelo Lacen/PR, deverá ser encaminhada amostra para Carga Viral de Hepatite C, sendo:

– 01 amostra de plasma recém coletada, encaminhada no próprio Tubo Preparador de Plasma – Tubo PPT (tampa pérola), fornecido pelo Lacen/PR.

Solicitar no GAL: Hepatite C Quantitativo – Biologia Molecular

Informar os resultados obtidos anteriormente no campo "Observações" da requisição do GAL ou impressos.

Para Hepatite D

Investigar Hepatite Delta somente em indivíduo que apresentar o HBsAg Reagente (vírus da Hepatite B) e que resida ou esteve em áreas endêmicas para este agravo.

Solicitar no GAL: Hepatite D

Para Hepatite E

Investigar Hepatite E somente após excluir Hepatites A, B e C, além dos vírus Epstein-Barr (EBV) e Citomegalovírus (CMV).

Informar os resultados obtidos anteriormente como excludentes, no campo "Observações" da requisição do GAL ou impressos.

Solicitar no GAL: Hepatite E

Consultar, também:

Manual de Coleta e Envio de Amostras Biológicas ao Lacen/PR -- Revisão 02, 2016.
Disponível em: <http://www.lacen.saude.pr.gov.br>

Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais – MS, 2015. Disponível em:
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2015/58551/manual_tecnico_hv_pdf_75405.pdf

Curitiba, 08 de novembro de 2016.


Juliana Neves Bachim
Farmacêutica - Bioquímica
CRF-PR 13792
LAGEN/SESA

Yatiyo Matsui Moriya
Farmacêutica Bioquímica da Seção de
Imunologia/Serviço de Hepatites


Elizabeth El Hajjar Droppa
Chefe da Divisão dos Laboratórios de
Epidemiologia e Controle de Doenças


Marlianna Freitas
Farmacêutica Bioquímica da Divisão de
DST/AIDS, Hepatites Virais e Tuberculose


Francisco Carlos dos Santos
Chefe da Divisão de DST/AIDS, Hepatites
Virais e Tuberculose