

SITUAÇÃO DO SARAMPO

DVVTR/CVE/DAV

CIB-PR 04 e 05/06/2019

SARAMPO

Doença viral altamente Infecto-contagiosa: Paramyxoviridae

- Transmissão: Através de gotículas aerossóis (fala, tosse, espirro etc)
- Período de Incubação: 4 a 21 dias
- Transmissibilidade: 6 dias antes e 6 dias depois do Exantema



• Sintomas prodrômicos: Febre alta, sinal de koplick, tosse, coriza e conjuntivite seguidos do Exantema (Exantema máculo-papular de distribuição céfalo caudal).

• Diagnóstico Laboratorial:

- Sorologia (IgG e IgM) coletados entre o 1º e 28º dias do início do exantema
- Isolamento viral (Urina e Swab de naso e orofaringe) até o 5º dia.

• Prevenção de novos casos: Bloqueio vacinal seletivo até 72 horas e isolamento domiciliar por 7 dias


Em Abril de 2015 - Certificado de Eliminação da Rubéola e da SRC nas Américas (OMS e OPAS)

Em Setembro de 2016 – Certificado de Eliminação do Sarampo nas Américas (OMS/OPAS)

Junho de 2017 – Sarampo na Venezuela

Fevereiro de 2018 – Sarampo no Brasil (Criança Venezuelana de 1 ano)

SARAMPO NO MUNDO



Fonte: Healthmap.org – 02/06/2019.

SARAMPO no BRASIL


Casos de Sarampo no Brasil, 2018

03/06/2019

Casos = 10.327

Óbitos = 12

361 (4 óbitos)




Fonte: GT Doenças Exantemáticas/MS
25/04/2019.

■ Casos confirmados

Casos de Sarampo no Brasil, 2019

03/06/2019

Casos = 87



Fonte: GT Doenças Exantemáticas/MS
25/04/2019.

■ Casos confirmados

Vacinação contra o Sarampo


VTV (Sarampo, Caxumba e Rubéola) e Vacina Tetra Viral (SCR+Varicela)

Faixa Etária a ser vacinada:



- De 12 a 15 meses: 1 dose da Vacina Tríplice Viral com 12 meses de idade e 1 dose da Vacina Tetraviral aos 15 meses;
- De 2 anos a 29 anos: 2 doses da Vacina Tríplice Viral;
- De 30 a 49 anos: 1 dose da Vacina Tríplice Viral;
- Profissionais de Saúde: 2 doses da Vacina Tríplice Viral independente da faixa etária.

Cobertura Vacinal SCR E TETRAVIRAL Por Município – Paraná - 2019

SCR – 1ª dose
12 meses



Tetraviral – 2ª dose
15 meses



Fonte: sipni.datasus.gov.br e sies.saude.gov.br
* Dados preliminares. Consulta

OBRIGADO

Renato Lopes
Ana Paula Stelmach

Divisão de Vigilância de Doenças Transmissíveis – DVVTRCVE/DAV

dvvtr.svs@sesa.pr.gov.br

(41) 3330-4561

Vera Rita Maia

Alessandra Simões

Divisão de Imunização – DVVPI/CVE/DAV

(41) 3330-4560