Pesquisas mostram que:

## **DE 1.000 HOMENS**

entre 55 e 69 anos que **realizam os exames de rotina** por 13 anos:

178 poderão ter um resultado alterado e descobrir, após realizar a biópsia, que **não** têm câncer de próstata.





A biópsia pode causar **dor,** sangramento e infecção.

confirmarão câncer de próstata, sendo que 50% desses cânceres serão de crescimento lento que não ameaça a vida.





A cada 100 homens que tratam com cirurgia\*, **60 poderão ter impotência** sexual e **20 incontinência urinária**.

\*aproximadamente 1 a cada 200 homens que fazem cirurgia pode ter complicações graves e morte.



morrerão de câncer de próstata, mesmo após o tratamento.

Saiba mais em:

www.inca.gov.br/ tipos-de-cancer/ cancer-de-prostata



poderá ter a morte evitada por câncer de próstata por causa dos exames.

Os benefícios de realizar esses exames são incertos, pois é mais provável que você tenha o diagnóstico de um câncer que não iria evoluir, e assim se expor desnecessariamente aos riscos do tratamento.



REFLITA, CONVERSE COM SEUS Familiares e decida o que é Melhor para você!

## Referências

FEN LOW, J. J. et al. Prostate-spoons antigen-based screening for prostate cancer, evidence report and systematic review for the US Preventive Services. Task Proce. JAMA, Chego, v. 319. n. B., p.184-391, May 2018. SCHRODER, F. H. et al. Screening and prostate cancer mortality: results of the European Randomised Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) at 13 years of follow-up. Lancet, London, v. 384, n. 9959, p. 2027-2035, Dec. 2014. ealth Care, 2019. Available at https://canadantas/droce.cu/ Access in 30 Oct 2019.

NITED STATES. Preventives services task force. Rockville: USPSTF, 2019. Available at https://www.uspreven-veservices.ass/droce.org/ Access in 30 Oct 2019.







