



# SEDAÇÃO EM CENÁRIO DE ESCASSEZ

## Opções:

- MIDAZOLAM: início - 0,01 a 0,05mg/kg. Manut: 0,02 a 0,1mg/kg/h.
- PROPOFOL: início - 0,3 a 0,6mg/kg/h. Manut: 0,3 a 3mg/kg/h.
- DEXMEDETOMIDINA: início - 1mcg/kg em 10 min. Manut: 0,2 a 0,7mcg/kg/h.
- CETAMINA: início - 0,5mg/kg. Manut: 0,3 a 1mg/kg/h.
- DIAZEPAM: início - 0,2 a 0,3mg/kg. Manut: 6 em 6 horas.
- CLONIDINA: início - 0,5 mcg/kg/h. Manut: 0,5 a 3mcg/kg/h.
- TIOPENTAL: início - 1mg/kg/h. Manut: 1 a 5mg/kg/h.

LEMBRAR QUE OPIÁCEOS TEM EFEITO SEDATIVO E CONTROLE DE DOR OTIMIZADA DIMINUI NECESSIDADE DE SEDATIVOS

UTILIZAR ESCALA RASS PARA SEDAÇÃO (ALVO: -1 A +1)

ATENÇÃO AOS EFEITOS ADVERSOS DE CADA CLASSE

ASSOCIAÇÃO DE SEDATIVOS DIMINUI USO DE BENZODIAZEPÍNICO EM DOSE ALTA

SE POSSÍVEL, PREFIRA BENZODIAZEPÍNICO DE MEIA-VIDA CURTA

**SEDAÇÃO PROFUNDA (RASS -5 A -4)**  
EM CASOS DE SDRA GRAVE (PAO<sub>2</sub>/FIO<sub>2</sub> <100) e/ou NECESSIDADE DE CURARIZAÇÃO e/ou POSIÇÃO PRONA